



Progetto Culturale SIO 2013 - 2014

*La Corretta Informazione
ed il Consenso del Paziente
in Implantologia*

Milano, 7 Febbraio 2014



SOCIETA' ITALIANA
DI IMPLANTOLOGIA
OSTEOINTEGRATA

SCHEDA di INFORMAZIONE
e di
ESPRESSIONE del CONSENSO
al
TRATTAMENTO IMPLANTO-PROTESICO

Coordinato da



SOCIETA' ITALIANA
DI IMPLANTOLOGIA
OSTEOINTEGRATA

In collaborazione con



Società Italiana di Medicina Legale
e delle Assicurazioni



COLEGIO DEI DOCENTI
DI ODONTOLOGIA



Commissione Nazionale
Albo Odontoiatri



Progetto Culturale SIO 2013 - 2014

La Corretta Informazione ed il Consenso del Paziente in Implantologia



SOCIETÀ ITALIANA
DI IMPLANTOLOGIA
OSTEOINTEGRATA



SCHEDA di INFORMAZIONE e di ESPRESSIONE del CONSENSO

Coordinatore

Luigi Guida

Professore Ordinario di Discipline Odontostomatologiche, Seconda Università degli Studi di Napoli.
Presidente SIO- Società Italiana di Implantologia Osteointegrata

Autori

Susanna Annibaldi

Professore Associato di Discipline Odontostomatologiche, Università La Sapienza di Roma.
Socio Attivo SIO

Antonio Barone

Professore Aggregato di Discipline Odontostomatologiche, Dipartimento di Chirurgia della
Università degli Studi di Pisa. Presidente SICOI - Società Italiana di Chirurgia Orale e
Implantologia

Carla Berliri

Dottore in Scienze Infermieristiche. Staff Tribunale Diritti del Malato-Cittadinanzattiva, Sede
Nazionale

Leonello Biscaro

Libero Professionista in Adria (RO) nel campo della Protesi. Presidente AIOP - Accademia
Italiana di Odontoiatria Protetica

Claudio Buccelli

Professore Ordinario di Medicina Legale. Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche
Avanzate, Università degli Studi di Napoli "Federico II". Vice Presidente SIMLA - Società
Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni

Giuseppe Cardaropoli

Professore a contratto e Consulente Scientifico, Università "Vita e Salute" San Raffaele di
Milano. Socio attivo SIO

Raffaele Cavalcanti

Libero professionista nel campo della Implantologia, Parodontologia e Chirurgia Orale.
Socio Attivo SIO

Domenico Del Forno

Professore Aggregato di Psicopatologia Forense, Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Pierpaolo Di Lorenzo

Professore Aggregato di Medicina Legale, Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Enrico Gherlone

Professore Ordinario di Discipline Odontostomatologiche, Presidente del Corso di Laurea in
Odontoiatria e Protesi Dentaria, Università "Vita e Salute San Raffaele" di Milano. Presidente
Eletto del Collegio dei Docenti di Odontoiatria

Luigi Guida

Professore Ordinario di Discipline Odontostomatologiche, Seconda Università degli Studi di
Napoli. Presidente SIO

Raffaele Iandolo

Odontoiatra Libero professionista in Avellino. Tesoriere FNOMCeO - Federazione Nazionale
degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Giuseppe Luongo

Professore a contratto, Università degli Studi di Napoli "Federico II", libero professionista in
Roma. Past President SIO

Fabio Mazzocco

Libero professionista nel campo della Implantologia, Parodontologia e Chirurgia Orale.
Socio Attivo SIO

Carmen Mortellaro

Professore Ordinario di Discipline Odontostomatologiche, Università del Piemonte Orientale.
Presidente SidCO-Società Italiana di Chirurgia Orale

Gian Aristide Norelli

Professore Ordinario di Medicina Legale, Dipartimento di Scienze della Salute, Università
degli Studi di Firenze. Vice Presidente SIMLA

Giacomo Oteri

Professore Aggregato di Discipline Odontostomatologiche, Università di Messina Socio Attivo SIO

Vilma Pinchi

Professore Associato di Medicina Legale, Università degli Studi di Firenze

Antonella Polimeni

Professore Ordinario di Discipline Odontostomatologiche, Direttore del Dipartimento di
Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali, Università "La Sapienza" di Roma.
Presidente Collegio dei Docenti di Odontoiatria

Giuseppe Renzo

Odontoiatra Libero professionista in Messina. Presidente CAO Nazionale - Commissione
Nazionale Albo Odontoiatri

Eugenio Romeo

Professore Associato di Discipline Odontostomatologiche, Università degli Studi di Milano.
Past President SIO

Enzo Rossi

Libero Professionista in Firenze nel campo dell'Implantologia e della Chirurgia Orale.
Past President IPA - International Piezosurgery Academy

Alessandro Zovi

Odontoiatra Libero professionista in Belluno. Consigliere CAO Nazionale



Progetto Culturale SIO 2013 - 2014

*La Corretta Informazione
ed il Consenso del Paziente
in Implantologia*

Milano , 7 Febbraio 2014



SOCIETA' ITALIANA
DI IMPLANTOLOGIA
OSTEOINTEGRATA

SCHEDA di INFORMAZIONE
sul
TRATTAMENTO IMPLANTO-PROTESICO



SCHEDA di INFORMAZIONE

Gentile Paziente,

con questa scheda informativa si riportano alla Sua attenzione, in forma scritta, i concetti espressi nel precedente colloquio, relativi al **trattamento implanto-protetico**.

Corre l'obbligo comunque di rappresentarLe che la presente scheda informativa sul trattamento implanto-protetico è integrativa e non sostitutiva dell'informazione resa in precedenza.

TRATTAMENTO IMPLANTO-PROTESICO

Il trattamento implanto-protetico rappresenta una terapia elettiva i cui benefici vanno sempre analizzati in rapporto ai fattori di rischio generali e locali, che possono influenzare il risultato negativamente.

Indicazioni

Le indicazioni principali all'utilizzo della terapia implantare sono:

- instabilità e/o mancanza di ritenzione di una protesi totale rimovibile;
- disagio psicologico associato alla condizione di portatore di protesi rimovibile;
- riabilitazione fissa di edentulie (assenza di denti) parziali dei settori posteriori (edentulie distali);
- riabilitazione fissa di edentulie parziali di uno o più elementi;
- sostituzione di uno o più elementi dentali giudicati non recuperabili;
- sostituzione di uno o più elementi dentali, in presenza di denti contigui sani per evitare di ridurli a monconi (pilastri di protesi fissa tradizionale);
- sostituzione di uno o più elementi dentali contigui a denti ritenuti inaffidabili come pilastri protesici.

Controindicazioni

Le controindicazioni assolute sono rappresentate da:

- condizioni generali del paziente, che costituiscono un impedimento assoluto a ogni tipo di procedura chirurgica orale, da identificare in modo puntuale;
- crescita scheletrica non completata;
- parodontite non trattata.

Fattori che possono condizionare il trattamento o comprometterne il risultato o la durata

- intolleranze e/o allergie a farmaci e materiali collegati al trattamento;
- malattie generali che colpiscono l'osso o che interferiscono con i meccanismi di guarigione della ferita;
- alterazioni vascolari che coinvolgono la sede di inserzione dell'impianto osteointegrato;
- difetti di coagulazione;
- diabete mellito (solo in mancanza di adeguato controllo della glicemia);
- effetti di particolari trattamenti (radioterapia del distretto testa-collo, chemioterapia oncologica, utilizzo di particolari farmaci quali, ad esempio, i bifosfonati);
- fumo (consumo > 10 sigarette al giorno);
- eccessiva assunzione di sostanze alcoliche;
- gravi stati di dipendenza da droghe;
- insufficiente igiene orale;



SCHEMA di INFORMAZIONE

- pregressa parodontite;
- osso non adatto per quantità, qualità e morfologia ad accogliere un impianto di dimensioni adeguate, ove le procedure chirurgiche correttive risultino non attuabili;
- inadeguatezza dello spazio necessario per la realizzazione di un manufatto protesico, qualora le procedure per modificare tale situazione non siano attuabili;
- discrepanze occlusali (alterazione del rapporto tra le arcate dentarie);
- parafunzioni (es. serramento, digrignamento) e abitudini viziate (es. stringere oggetti tra i denti);
- ridotta apertura della bocca;
- carente collaborazione (mancato rispetto degli appuntamenti concordati).

L'associazione di più fattori comporta l'amplificazione del rischio d'insuccesso della terapia implanto-protesica.

Esami radiologici

Accertamenti radiodiagnostici del distretto maxillo-facciale preventivi, intraoperatori e di controllo rappresentano parte integrante imprescindibile del piano di trattamento.

Descrizione dell'intervento chirurgico

L'intervento chirurgico di inserzione dell'impianto endosseo può prevedere una procedura in una unica fase (monofasica) o in due fasi (bifasica), con inserimento dell'impianto, che viene coperto dalla mucosa, e successiva esposizione, da eseguire dopo un adeguato periodo di attesa.

In pazienti selezionati e in casi particolari, l'inserzione dell'impianto può avvenire senza l'incisione e il sollevamento di un lembo (intervento flapless).

La procedura di inserzione degli impianti prevede:

- anestesia locale mediante iniezione di farmaci anestetici locali con o senza vasocostrittore, eventualmente associata a sedazione cosciente;
- incisione e scollamento dei tessuti molli, per consentire l'accesso all'osso sottostante;
- preparazione nell'osso dell'alloggiamento implantare;
- inserimento dell'impianto;
- applicazione dei punti di sutura.

Durante la fase intra-operatoria

potrebbe essere necessario, in base alle caratteristiche anatomiche del sito chirurgico:

- modificare, rispetto a quanto programmato, il numero e/o la posizione degli impianti da inserire;
- adottare o modificare tecniche d'incremento osseo (vedi in seguito).

In caso di protocollo bifasico

è necessario ricorrere a un secondo intervento di esposizione degli impianti, che prevede:

- anestesia locale mediante iniezione di farmaci anestetici locali con o senza vasocostrittore;
- incisione ed eventuale scollamento della mucosa, per consentire l'accesso alla testa dell'impianto;
- sostituzione della vite tappo (posizionata sulla testa dell'impianto e coperta dalla mucosa) con pilastro trans-mucoso;
- eventuale applicazione di punti di sutura.



SCHEDA di INFORMAZIONE

Terapia farmacologica

La terapia medica pre e post-intervento può consistere nella somministrazione di antibiotici, antinfiammatori e antidolorifici.

Decorso post-operatorio

(conseguente alla fase di inserzione dell'impianto e/o all' eventuale fase di scoperta)

Durante il decorso post-operatorio è necessario:

- riprendere l'alimentazione solo dopo la scomparsa dell'effetto anestetico, per evitare di mordersi involontariamente le guance, le labbra e la lingua;
- assumere cibi liquidi e freddi per il giorno dell'intervento;
- non porsi alla guida immediatamente dopo l'esecuzione dell'intervento;
- procedere alle normali manovre di igiene orale, fatta eccezione per la zona dell'intervento, e associare l'utilizzo indispensabile di antisettici locali (collutori, gel medicati, spray, etc.);
- evitare la pratica sportiva nei giorni successivi all'intervento;
- astenersi dal fumo, o quanto meno ridurre il numero delle sigarette fumate, per un periodo più o meno lungo, in funzione dell'intervento eseguito;
- evitare per alcune settimane traumatismi nella zona dell'intervento.

Nel decorso post-operatorio si possono verificare:

- eventi frequenti quali ecchimosi (lividi), ematoma, edema (gonfiore) dei tessuti molli, sanguinamento, dolore, limitazione all'apertura della bocca, difficoltà nella masticazione di cibi solidi. Tali manifestazioni sono, in genere, di entità contenuta e controllabili con opportuna terapia;
- eventi occasionali come secrezioni, ascesso, cedimento dei punti di sutura, ingrossamento dei linfonodi del collo.

Procedure chirurgiche particolari

In presenza di siti caratterizzati da un volume osseo insufficiente al corretto alloggiamento di impianti di adeguate dimensioni, si può rendere necessaria l'adozione di tecniche chirurgiche d'incremento osseo che, in relazione alle diverse condizioni cliniche, possono essere eseguite contestualmente o precedentemente al posizionamento implantare. Esse, inoltre, possono prevedere l'impiego di prodotti biologici o biomateriali di derivazione autologa (tessuto prelevato dal paziente), omologa (proveniente da banca dei tessuti), eterologa (di derivazione animale), sintetica (di produzione industriale).

Tali tecniche possono richiedere procedure aggiuntive, esporre al rischio di specifiche complicanze (es. esposizione dei materiali utilizzati, infezione), esitare in una protesi non ottimale dal punto di vista funzionale e/o estetico (es. parziale esposizione delle componenti implantari, dente più lungo degli adiacenti, spazi interdentali più ampi/stretti del consueto).

In presenza di un volume osseo non ottimale, in pazienti selezionati e in casi particolari, è possibile ricorrere a soluzioni alternative alle tecniche di incremento osseo (impianti di dimensioni ridotte, posizionamento inclinato degli impianti, estensioni protesiche mesiali o distali).



Nel caso in cui si renda necessario estrarre un elemento dentario irrecuperabile, dopo l'estrazione e prima dell'inserimento dell'impianto, viene generalmente osservato un periodo di attesa adeguato a consentire la guarigione del sito post-estrattivo ed è possibile adottare procedure di preservazione del volume osseo, per intercettare l'inevitabile riassorbimento osseo post-estrattivo soprattutto in zona estetica.

In pazienti selezionati e in casi particolari, l'inserimento dell'impianto può essere eseguito contestualmente all'estrazione (impianto post-estrattivo immediato) o essere differito di alcune settimane, ad avvenuta guarigione dei tessuti molli (impianto post-estrattivo differito).

È possibile infine adottare una procedura chirurgica guidata da una dima costruita in funzione della riabilitazione protesica progettata sul modello tradizionale oppure sul modello virtuale e tridimensionale del mascellare, generato da un programma computerizzato sulla base dei dati acquisiti con un esame tomografico computerizzato (Implantologia Computer Guidata).

Descrizione delle procedure protesiche

Le procedure necessarie alla costruzione della protesi definitiva a supporto implantare, che può essere preceduta o meno dalla protesi provvisoria, consistono in:

- rilievo delle impronte e registrazioni occlusali;
- eventuale inserimento della protesi provvisoria a supporto implantare;
- prova delle componenti protesiche (abutment, strutture, etc.);
- inserimento della protesi definitiva.

La scelta del tipo di riabilitazione protesica da adottare spetta esclusivamente al clinico, che la propone al paziente perché la possa accettare o meno alla luce delle informazioni fornitegli.

Dopo l'inserimento dell'impianto e prima di procedere al carico protesico viene generalmente osservato un tempo di attesa adeguato a consentire la realizzazione dell'osteointegrazione (in genere 2-3 mesi).

In pazienti selezionati e in casi particolari, il posizionamento della protesi può essere eseguito contestualmente all'inserimento chirurgico dell'impianto (carico immediato) o dopo un tempo di attesa più breve di quello convenzionale (carico precoce). In taluni casi, quando la densità ossea è particolarmente sfavorevole e la stabilità dell'impianto non è ottimale, sarà necessario osservare un tempo di attesa più lungo di quello convenzionale (carico ritardato).

Dispositivi medici e materiali collegati al trattamento implanto-protesico (biomateriali, prodotti biologici e materiali protesici)

Nel trattamento implanto-protesico possono essere impiegati:

- impianti endoossei in titanio/ zirconio/ tantalio;
- viti di guarigione e per procedure di rigenerazione ossea in titanio;
- materiali di riempimento per difetti ossei e membrane riassorbibili e non riassorbibili di derivazione: autologa (tessuto prelevato dal paziente), omologa (proveniente da banca dei tessuti), eterologa (di derivazione animale), sintetica (di produzione industriale). Tali materiali sono sottoposti a specifiche normative inerenti certificazione di origine, biocompatibilità, tossicità, allergenicità e sicurezza;
- monconi in titanio/ lega metallica/ zirconia;
- corone protesiche in lega metallica/ zirconia/ ceramica/ materiali compositi;
- protesi rimovibili in resina acrilica/ lega metallica/ materiali compositi.



Benefici dell'intervento

In generale i benefici dell'implantologia sono rappresentati dalla possibilità di:

- sostituire i denti mancanti senza coinvolgere i denti naturali, che altrimenti dovrebbero essere ridotti a moncone per applicarvi una protesi fissa tradizionale;
- avere una protesi parziale fissa nel caso di pazienti privi di elementi dentari nei settori posteriori (edentulia distale);
- avere una protesi totale fissa o avere elementi stabilizzanti la protesi rimovibile, nei pazienti totalmente edentuli.

Complicanze del trattamento implanto-protetico

(Un evento avverso o il mancato successo del trattamento implanto-protetico non sempre sono evitabili nonostante l'esecuzione della più corretta pratica diagnostico-terapeutica.)

Le complicanze del trattamento implanto-protetico sono relative a:

- impiego inevitabile di anestetico locale, che potrebbe dar luogo a reazioni allergiche, a manifestazioni tossiche ovvero a reazioni cardiovascolari. Si evidenzia tuttavia che le reazioni allergiche a tali farmaci sono rare; altresì rare sono le manifestazioni tossiche salvo casi di accertate e gravi patologie sistemiche (epatopatia, nefropatia, ecc); rare sono, infine, le reazioni cardiovascolari, maggiormente possibili in caso di preesistenti cardio-vasculopatie (per tale motivo è importante che il paziente ne segnali all'odontoiatra l'eventuale presenza);
- particolari terapie farmacologiche, come l'assunzione di bifosfonati, correlabile a fenomeni di necrosi delle ossa mascellari;
- mancata osteointegrazione, dovuta a cause non prevenibili, con conseguente perdita dell'impianto (in questo caso, quando possibile, si potrà ricorrere all'inserimento di un nuovo impianto in sostituzione di quello perduto);
- imprevedibile e anomalo rimaneggiamento dei tessuti duri e molli durante la fase di guarigione, che può esitare in risultati funzionali ed estetici non ottimali o duraturi;
- lesione del nervo alveolare inferiore e/o del nervo linguale, che può provocare alterazione della sensibilità temporanea o permanente rispettivamente del labbro inferiore/mento e dell'emilingua omolaterale, negli interventi sulla mandibola;
- perforazione della membrana di rivestimento del seno mascellare (cavità presente nell'osso mascellare) durante l'intervento di rialzo del pavimento dello stesso, che può esporre al rischio di sinusite acuta o cronica, e che, se di grandi dimensioni, può richiedere la sospensione dell'intervento, che dovrà essere rimandato a guarigione ottenuta;
- infiammazione della mucosa (mucosite) e dell'osso (perimplantite) intorno agli impianti osteointegrati che determina un riassorbimento osseo progressivo e può condurre alla perdita dell'impianto. Si tratta di una malattia che può manifestarsi in maniera evidente dopo la protesizzazione degli impianti. Essa colpisce con una maggiore frequenza pazienti che non osservano una corretta igiene orale domiciliare, non rispettano i protocolli di mantenimento e fumano (alcune patologie, quali la pregressa parodontite, il diabete scompensato, le patologie del metabolismo osseo, le patologie del sistema immunitario, o alcune abitudini, quali il fumo di sigaretta, aggravano il rischio di perdita precoce e tardiva dell'impianto);



SCHEDA di INFORMAZIONE

- inconvenienti tecnici a carico delle componenti prefabbricate (allentamento o frattura delle viti di serraggio, cedimento o frattura dei pilastri protesici), delle sovrastrutture e dei manufatti protesici fabbricati in laboratorio o dei materiali che li costituiscono (frattura delle strutture metalliche e/o della ceramica, distacco dei rivestimenti in resina o in composito, frattura delle protesi rimovibili). Va sottolineato che pazienti con parafunzioni (es. bruxisti) sono maggiormente esposti a questo tipo di rischio.

Avvertenze:

La buona riuscita di una riabilitazione implanto-protesica è fortemente influenzata dall'impegno del Paziente nel:

- seguire le raccomandazioni post-operatorie ricevute, rispettando le prescrizioni farmacologiche, osservando le indicazioni per un'alimentazione appropriata nei giorni post-intervento, avvisando tempestivamente l'odontoiatra di qualsiasi manifestazione patologica insorta nel post-operatorio (sanguinamenti eccessivi, perdurare dell'anestesia, del gonfiore e del dolore, rialzi febbrili, ecc.);
- presentarsi a tutti i controlli prescritti dall'odontoiatra nel periodo di osteointegrazione dell'impianto;
- seguire attentamente le indicazioni per l'igiene domiciliare e professionale. Le riabilitazioni protesiche su impianti necessitano di essere mantenute in perfetto stato di igiene orale domiciliare, seguendo scrupolosamente le indicazioni ricevute;
- presentarsi ai richiami di igiene orale e ai controlli clinici regolari, eventualmente integrati da esami radiografici, dopo l'applicazione della protesi su impianto. Generalmente sono previste visite di controllo e sedute di igiene orale ogni 3-4 mesi nel primo anno e successivamente con una cadenza personalizzabile a discrezione del professionista e sulla base delle esigenze cliniche obiettive e soggettive del paziente (non meno di due volte all'anno). Il mancato rispetto delle suddette visite di controllo e delle relative manovre di igiene professionale sugli impianti può compromettere il risultato della riabilitazione. Nel caso in cui, durante i controlli clinici, venisse formulata diagnosi di patologia dei tessuti perimplantari o parodontali, potrebbe rendersi necessario il ricorso a procedure supplementari finalizzate ad affrontare tempestivamente i problemi riscontrati. Occorre sottolineare che, allo stato attuale, le conoscenze sulle patologie perimplantari non consentono di predire del tutto i risultati terapeutici. La perimplantite può causare la perdita dell'impianto/i inserito/i, decretando il fallimento della terapia implantare.

Durata prevedibile dell'implanto-protesi

Allo stato delle attuali conoscenze non è ancora possibile precisare quale sia la durata di un'efficace riabilitazione implanto-protesica; essa, infatti, può variare in funzione dell'età e delle caratteristiche della persona, delle condizioni di partenza, della tipologia, estensione, complessità del manufatto e dei materiali protesici impiegati, di eventuali sopravvenuti fattori patologici nonché del rispetto delle avvertenze di cui sopra. La durata può essere facilmente compromessa e ridotta anche sostanzialmente, laddove il paziente venga meno al grado di collaborazione richiesto nell'igiene domiciliare e nei controlli periodici.

Pur nelle incertezze e nel condizionamento dei fattori di cui sopra si può dire che, dai dati della letteratura specialistica, ad oggi è possibile desumere una durata indefinibile dell'impianto endo-osseo e una durata media di diversi anni della relativa protesi.



Progetto Culturale SIO 2013 - 2014

*La Corretta Informazione
ed il Consenso del Paziente
in Implantologia*

Milano , 7 Febbraio 2014



SOCIETA' ITALIANA
DI IMPLANTOLOGIA
OSTEOINTEGRATA

ESPRESSIONE
del
CONSENSO INFORMATO
AL TRATTAMENTO IMPLANTO-PROTESICO



ESPRESSIONE del
CONSENSO INFORMATO

Gentile Paziente,

questo modulo per la dichiarazione del consenso informato riporta alla Sua attenzione, in forma scritta, i concetti espressi nel precedente colloquio e nella scheda informativa relativi al **trattamento implanto-protetico** nel suo specifico caso clinico, onde ricevere da Lei l'eventuale consenso a prestarLe le cure di seguito sintetizzate.

Corre l'obbligo comunque di rappresentarLe che il presente modulo è integrativo e non sostitutivo dell'informazione resa in precedenza.

ESPRESSIONE del CONSENSO INFORMATO
al TRATTAMENTO IMPLANTO-PROTESICO

INTESTAZIONE DELLO STUDIO/AMBULATORIO ODONTOIATRICO

Via _____ n _____ Città _____ c.a.p _____

Tel. _____ Fax _____

E-Mail _____

DATI ANAGRAFICI DEL PAZIENTE

Nome _____ Cognome _____

Nato a _____ il _____

Residente in _____ Via _____ n _____

tel/cell _____

e-mail _____

documento identità n. _____

L'informazione è stata data, mediante colloquio e consegna della scheda informativa sul trattamento implanto-protetico, il giorno:



Progetto Culturale SIO 2013 - 2014

*La Corretta Informazione
ed il Consenso del Paziente
in Implantologia*



SOCIETA' ITALIANA
DI IMPLANTOLOGIA
OSTEOINTEGRATA

**ESPRESSIONE del
CONSENSO INFORMATO**

Ulteriori eventuali modalità informative mediante supporto di

Immagini si no
scritti si no
audio-visivi si no
tecnologie digitali si no

Nome del professionista che ha somministrato l'informazione e ha raccolto il consenso:

Nome di altri soggetti che hanno assistito alla spiegazione:

Accertamenti diagnostici eseguiti:

- Modelli di studio si no
- Radiografie endorali si no
- Ortopantomografia delle arcate dentarie si no
- Tomografia Computerizzata dei mascellari si no
- Documentazione fotografica si no

Altro

Diagnosi

Piano di trattamento

Indagini strumentali e terapie odontoiatriche propedeutiche al trattamento implanto-protetico



ESPRESSIONE del
CONSENSO INFORMATO

Procedure Chirurgiche

Chirurgia implantare:

inserzione di n _____ impianti in sede _____

Chirurgia di incremento osseo:

tecnica chirurgica _____ in sede _____

Altro

Utilizzo di biomateriali e/o prodotti biologici

(N.B. L'impiego di impianti e biomateriali può subire modifiche in relazione a sopravvenute valutazioni cliniche intraoperatorie; in tale caso se le condizioni cliniche richiedono che il paziente fornisca valido ulteriore consenso rispetto a quanto precedentemente concordato verranno date informazioni aggiuntive perché possa farlo. In caso di diniego si procederà secondo il consenso dato in precedenza. In tale estrema ipotesi se la procedura terapeutica richiesta dal paziente contrasta con i convincimenti clinici dell'odontoiatra, questi potrà astenersi dal praticarla sempre che, data la particolarità della circostanza, ciò non risulti di nocumento al paziente).

Procedure Protesiche

Protesi provvisoria si no

Protesi definitiva _____

Altro

Possibili alternative terapeutiche

Protesi fissa a supporto dentario si no

Protesi adesiva si no

Protesi rimovibile parziale si no

Protesi rimovibile totale si no

Altro



**ESPRESSIONE del
CONSENSO INFORMATO**

Prognosi in caso di mancato trattamento

Benefici

Limiti

Aumentato rischio di complicanze o rischi specifici

Controlli necessari

ogni: _____ durante la fase di osteointegrazione

ogni: _____ dopo l'applicazione della protesi

Durata presumibile del trattamento

(N.B. La durata del Suo trattamento può subire modifiche in relazione a eventi e/o circostanze non prevedibili, né prevenibili)

Coinvolgimento di altri sanitari si no

Titolo della partecipazione:

collaborazione chirurgica si no

collaborazione protesica si no

formazione si no

aggiornamento si no

Onorario del trattamento

come da preventivo



Progetto Culturale SIO 2013 - 2014

*La Corretta Informazione
ed il Consenso del Paziente
in Implantologia*



SOCIETA' ITALIANA
DI IMPLANTOLOGIA
OSTEOINTEGRATA

**ESPRESSIONE del
CONSENSO INFORMATO**

La presente dichiarazione, integrativa della comunicazione verbale, mi è stata lasciata in visione, unitamente alla scheda informativa sul Trattamento Implanto-protetico in generale, in data _____ per poterla esaminare e/o farla esaminare anche da persone di mia fiducia.

Ho altresì avuto la possibilità di richiedere tutte le spiegazioni ritenute utili, ottenendo risposte chiare e soddisfacenti dai sanitari proponenti il trattamento implanto-protetico.

In data _____ mi sono stati resi ulteriori chiarimenti ed eventuali integrazioni all'informativa:

Io sottoscritto _____ dichiaro di avere letto integralmente e con attenzione questa dichiarazione e la scheda informativa, di avere pienamente compreso i concetti relativi al trattamento implanto-protetico in generale e al mio specifico caso clinico. Dichiaro di avere compreso caratteristiche, modalità e finalità del trattamento implanto-protetico propostomi. Dichiaro che il medico/odontoiatra mi ha spiegato con chiarezza il contenuto della dichiarazione e della scheda informativa e quindi di avere compreso appieno anche i rischi del trattamento. Sono ben consapevole del fatto che qualunque atto medico può comportare rischi non sempre prevedibili né prevenibili.

Dichiaro di essere consapevole del fatto che la firma del presente modulo di consenso informato da parte del medico e del paziente non costituisce esenzione di responsabilità in caso di eventuale errore di diagnosi, cura e terapia.

Dichiaro di essere consapevole della possibilità di revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento implanto-protetico propostomi.

Dichiaro pertanto di prestare il mio consenso alle terapie prospettatemi. Mi impegno a sottopormi ai controlli previsti e all'esecuzione degli esami strumentali eventualmente necessari nella programmazione e realizzazione del trattamento implanto-protetico e in occasione dei controlli periodici post-trattamento.

Firma del Paziente

Data _____

Firma del medico che ha informato

Firma di altre persone presenti



Progetto Culturale SIO 2013 - 2014

*La Corretta Informazione
ed il Consenso del Paziente
in Implantologia*

**ESPRESSIONE del
CONSENSO INFORMATO**



SOCIETA' ITALIANA
DI IMPLANTOLOGIA
OSTEOINTEGRATA

Consenso all'atto medico nei minori e nell'adulto incapace

Per erogare un trattamento diagnostico-terapeutico in un soggetto di età inferiore ai 18 anni è necessario acquisire il consenso di entrambi i genitori.

Firma del Padre

Data _____

Firma della Madre

In mancanza di entrambi i genitori il minore è affidato al tutore, nominato dal giudice tutelare, che sarà investito del diritto all'esercizio della potestà e al quale, come tale, competerà la prestazione del consenso al trattamento sanitario sul minore.

Firma del Tutore

Data _____

Per erogare un trattamento diagnostico-terapeutico in un soggetto adulto incapace di intendere e di volere è necessario acquisire il consenso del tutore o dell'amministratore di sostegno.

Firma del Tutore

Data _____

Firma dell'Amministratore di sostegno
